

Über Gefäßst tuberkulose r weichen Hirnhäute mit tödlicher intrazerebraler Blutung.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
der
Hohen Medizinischen Fakultät
der
Georg August-Universität zu Göttingen

vorgelegt von

Maria Kaup,

Medizinalpraktikantin in Witten (Ruhr).

Mit 5 Abbildungen im Text.

Über Gefäßst Tuberkulose der weichen Hirnhäute mit tödlicher intrazerebraler Blutung.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
der
Hohen Medizinischen Fakultät
der
Georg August-Universität zu Göttingen

vorgelegt von
Maria Kaup,
Medizinalpraktikantin in Witten (Ruhr).

Mit 5 Abbildungen im Text.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA40154024_0015

AUS DEM PATHOLOGISCHEN INSTITUT DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN.

(DIREKTOR: GEHEIMRAT KAUFMANN.)

Über Gefässtuberkulose der weichen Hirnhäute mit tödlicher intrazerebraler Blutung.

Von

Maria Kaup.

Mit 5 Abbildungen im Text.

Die tuberkulöse Meningitis ist in vielen Fällen keine reine Erkrankung der weichen Hirnhäute, sondern der tuberkulöse Prozess greift bei genügender Dauer der Erkrankung, den Piasepten folgend, auf die Gehirnsubstanz über, dass eine Meningoenzephalitis entsteht. Bei der mikroskopischen Untersuchung findet man dann in diesen enzephalitischen Herden wie in den Meningealen sonstigen entzündlichen Prozessen vor allem Gefässveränderungen, wie ich sie im Laufe meiner Ausführungen noch eingehend beschreiben werde. Sie führen oft zu kleinen Hirnblutungen (Biber³). Eine sehr seltene Komplikation aber sind Hämorrhagien grösserer Ausdehnung, welche die Gehirnsubstanz in weitem Umfange zerstören und schnell den Tod herbeiführen.

Ein solcher Fall, bei dem die tuberkulösen Gefässveränderungen in besonders hohem Masse zur Ausbildung gelangten, kam hier im pathologischen Institut zur Sektion und wurde mir von Herrn Geheimrat Kaufmann zur Bearbeitung übergeben.

Vor der näheren Beschreibung seien kurz die in der Literatur mitgetheilten ähnlichen Fälle zusammengestellt.

Schon Seitz¹⁸, Hirschberg⁹, Reinhold¹⁵ und Huguenin¹⁰ haben bei Meningitis tuberculosa grosse intrazerebrale Blutungen gesehen, ohne sich jedoch eingehender mikroskopisch mit ihnen zu beschäftigen oder sich darüber klar zu werden, wodurch die Hämorrhagie bedingt war.

Die erste gründliche Beobachtung stammt von Nonne¹² aus dem Jahre 1900. Er berichtet von einer Patientin, die längere Zeit über Mattigkeit, Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt hatte. Plötzlich traten bei ihr nach kurzdauernden Zuckungen in der linken Gesichtshälfte Lähmungen in der oberen und unteren Extremität der linken Seite auf. Dazu kamen Benommenheit, Pulsverlangsamung, Erbrechen und Nackensteifigkeit. Unter zunehmender Verschlimmerung des Zustandes erfolgte am achten Tag nach Eintritt der Lähmung der Exitus letalis.

Die Sektion ergab folgenden Befund: An der Gehirnkongvexität massenhafte Aussaat graugelber Knötchen, am reichlichsten in der Gegend der vorderen und hinteren Zentralwindung. An der Hirnbasis nur eine trübe, leicht sulzige Beschaffenheit der Pia. Im Gebiet der rechten Zentralwindung findet man eine blutig gefärbte Hirnpartie, die dicht hinter dem vorderen Stirnpol beginnt und sich ca. 1 cm hinter die hintere Zentralwindung erstreckt. Sie reicht bis 6 cm in den Marklager hinein und löst sich an der Peripherie in teils miteinander konfluierende teils isolierte bis erbsengrosse Herdchen und Herde auf.

Das Mikroskop deckte starke Veränderungen an den pialen Gefässen auf, die zwar ausschliesslich an den Arterien auf, die im Sinne einer Endarteriitis meso- und Periarteriitis erkrankt waren. Durch intensive Wucherung der Intima kam es an manchen Stellen zu teilweisem oder auch vollständigem Verschluss des Gefässlumens. Miliare Tuberkel wurden nicht gefunden. Wie sich wohl durch diese Arterienveränderungen die Hämorrhagie entstanden denkt, wird näher erörtert.

Vier Jahre später beschreibt Vanzetti²⁰ einen Fall von tuberkulöser Meningitis mit „akuter hämorrhagischer Enzephalitis“ bei einem kleinen Knaben, der plötzlich von einer vollständigen rechtsseitigen Lähmung befallen wurde. Bei der Sektion fand sich eine akute Miliartuberkulose mit ausgedehnter Meningitis, die zu einer hämorrhagischen Erweichung im linken Thalamus opticus, Linsenkern und in der Inselwindung geführt hatte. Die mikroskopische Untersuchung enthüllte ausser tuberkulösen Gefässerkrankungen eine Thrombose der Pia-venen. Vanzetti begnügt sich bei der Frage nach der Genese der Blutung mit der Annahme, dass durch direkte Einwirkung von Tuberkelbazillen eine akute Alteration der Gefässwände mit Thrombenbildung entstanden sei, die zur Extravasation geführt habe.

Im Jahre 1910 veröffentlichte Askanazy¹ drei weitere uns interessierende Fälle, bei denen die Sektion wiederum grössere intrazerebrale Hämorrhagien als Todesursache ergeben hatte.

Im Falle 1 handelt es sich um einen 21jährigen Mann, der klinisch das typische Bild der tuberkulösen Meningitis geboten hatte, kompliziert mit einer linksseitigen Fazialis- und Abduzensparese. Die Autopsie ergab eine frische tuberkulöse Meningitis. Ausserdem wies die Spitze des rechten Schläfenlappens einen „ca. zweimarkstückgrossen hämorrhagischen Erweichungsherd“ auf, der teilweise noch auf das Ammonshorn übergrieff und sich ins Unterhorn eröffnete. Bei der mikroskopischen Untersuchung der Präparate fiel eine ausgedehnte Venenthrombose auf, die zu mehr oder weniger vollständigem Verschluss des Lumens geführt hatte.

Beim 2. Fall waren während des Lebens ausser dem allgemein-meningitischen Syndrom als Herdsymptome: Aphasie, rechtsseitige Ptosis und leichte rechtsseitige Hemiparese nachweisbar. Sektionsbefund: Neben typischer Meningitis mit reichlichen Tuberkeln „blutige Infiltration der basalen Meningen und hämorrhagische Erweichung der darunter liegenden Hirnsubstanz.“ Daneben zeigte sich auf der rechten Seite des Pons eine blutige Erweichung, die den basalen und vorderen Teil zerstört hatte. An der Oberfläche der Brücke einige kleine thrombotische Gefässe.

Der 3. Fall betraf einen 31jährigen Mann, der intra vitam allgemein-meningitische Erscheinungen, kompliziert mit zerebralen Herdsymptomen gezeigt hatte, die den Prozess auf die rechte Seite des Gehirns zu lokalisieren gestatteten: linksseitige Mydriasis, linksseitige Fazialisparese, Reflexe auf der linken Seite gesteigert, linksseitiger Babinski, epileptiforme Krämpfe. Die Sektion ergab neben disseminierter Miliartuberkulose mit tuberkulöser Meningitis eine blutige Erweichung im rech-

amus opticus. Mikroskopisch fand sich eine starke Gefäßveränderung vor allem am Plexus chorioideus mit Venenthrombosen.

Askanazy betont bei seinen drei Fällen das Zusammentreffen von Venenthrombose mit blutiger Hirnerweichung — wie es Vanzetti ja auch schon gesehen hat — und konnte eine kausale Abhängigkeit zwischen diesen beiden Faktoren nicht feststellen, als die Blutung immer in demjenigen Gehirnbezirk auftrat, in dem der Venenverschluss der Blutabfluss gehindert war. Damit die zur Hämorrhagie führende Stase höheren Grades zustande kam, musste entweder eine grössere Pia-venenthrombose und die Thrombose dann schon makroskopisch nachweisbar sein, oder es mussten in einem grösseren Meningealabschnitt zahlreiche kleinere Venen verengt sein, um durch Summation den gleichen Effekt auslösen zu können. Und welche Ursache fand sich für eine solche Venenthrombose? Askanazy wies an mehreren Schnitten nach, dass sie Folge einer tuberkulösen Venenentzündung sei. Diese manifestierte sich entweder in Form von kleinen Wandtuberkeln oder in Form einer flächenhaft ausgebreiteten tuberkulösen Endophlebitis. Kam es bei Verkäsung der tuberkulösen Produkte zu einer Läsion des Endothels, so bildete sich an dieser Stelle bei zunächst noch strömendem Blut ein reiner Abscheidungsthrombus, an den häufig weiterhin ein Gerinnungsthrombus rückläufig anfügte, der zu einem Gefäßverschluss innerhalb der Gehirnsubstanz führte und so bei erhaltenem arteriellen Blutfluss zu einem Stauungsinfarkt des Gehirngebietes Veranlassung gab. Dass allein diese Stase die Blutextravasation bedingte, glaubt der Autor durch das fast völlige Fehlen jeglicher entzündlichen Prozesse innerhalb der Gehirnsubstanz beweisen zu können.

Durch diese Beobachtungen Askanazys aufmerksam gemacht, untersuchte Reuter¹⁶ 1919 an Hand eines typischen Falles nochmals eingehend die Abhängigkeit der Blutung bei Meningoencephalitis tuberculosa von einer Venenthrombose im Bereich der Pia. Es handelte sich um einen Patienten, der in völlig verwirrtem Zustand in die Klinik aufgenommen und, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen, bald im Tode verschieden war. Das Krankheitsbild wurde erst durch die Sektion geklärt. Diese ergab eine Meningitis tuberculosa mit besonders starker Beteiligung der Umgebung der Arteria fossae Sylvii. Im linken Stirnlappen sah man eine ausgedehnte Blutung, hervorgerufen durch hochgradigste venöse Stase, die ihrerseits bedingt war durch einen schon makroskopisch nachweisbaren Thrombus, der im Anfangsteil des Stammes der Vena fossae Sylvii sinistra das Lumen vollständig verlegte. Der Verfasser weist in gründlicher Untersuchung nach, dass das hämorrhagisch infarzierte Gebiet dem Ursprungsgebiet der thrombosierten Vene entspricht, deren Wand vollkommen von tuberkulösem Gewebe durchsetzt war.

In den bisher mitgeteilten Fällen scheinen somit die stärkeren Hirnerweichungen bald in Veränderungen des arteriellen (Nonne), bald in solchen des venösen Gefässsystems (Vanzetti, Askanazy, Reuter) ihre Ursache zu haben. Stets zeigte das klinische Bild nicht nur den allgemeinen meningitischen Symptomenkomplex als Folge der diffusen Erkrankung der Meningen, sondern es kamen noch infolge des lokalisierten zerebralen Prozesses bestimmte Herdsymptome hinzu. Diese können sogar so im Vordergrund stehen, dass das allgemein-meningitische Syndrom von ihnen verdeckt und infolgedessen die Diagnose dann leicht auf einen isolierten Hirnprozess, besonders Tumor, gestellt wird. Noch schwieriger wird die Diagnose, wenn nach bestimmten Vorläufern eine stärkere Hirnblutung zu dem plötzlich auftretenden Bild des apoplektischen Insultes führt.

So verhielt es sich z. B. bei unserem Fall, der mit der Diagnose rechtsseitiger Brückenherd (Tumor, Lues?) zur Sektion geschickt wurde. Als Ursache des sehr schnell erfolgenden Exitus letalis hatte man eine komplizierende Hämorrhagie vermutet.

Aus der Krankengeschichte, für deren freundliche Überlassung ich dem Direktor der hiesigen Nervenklinik, Herrn Geheimrat Schultze, zu besonderem Dank verpflichtet bin, sei folgendes berichtet: Es handelt sich um einen 24jährigen Mann, der in leicht benommenem Zustand am 9. VI. 1925 mittags in die hiesige Nervenklinik aufgenommen wurde. Auf Fragen vermochte er zunächst noch zu antworten, dass er Kopfschmerzen habe, dass ihm übel sei, und dass seit letzter Nacht seine linke Seite gelähmt sei.

Vom Bruder des Kranken wird bei der Aufnahme folgende Anamnese angegeben. Der Patient hat 1919 eine Lungenentzündung durchgemacht, ist sonst nie krank gewesen. Eine luetische Infektion wird negiert. In diesem Frühjahr hatte sich der Kranke stark erkältet und über Kreuzschmerzen geklagt. Vor 14 Tagen traten Kopfschmerzen und Erbrechen auf; später kamen noch Müdigkeit in den Beinen und allgemeine starke Ermattung hinzu. In der letzten Zeit hat der Patient kaum geschlafen. Vergangene Nacht ist er plötzlich auf der linken Seite steif geworden. Temperatursteigerungen wurden nie beobachtet.

Bei der Verlegung auf die Station unterhält sich der Kranke noch mit seinem Bruder. In der nächsten Stunde tritt aber starkes Erbrechen auf. Der Patient ist vollkommen benommen, liegt meist mit geschlossenen Augen und schnarchend röchelnder Atmung da und lässt unter sich.

Abends 6½ Uhr: Patient liegt ruhig in seinem Bett. Das linke Auge ist geschlossen, das rechte halb geöffnet, die Cornea ist rechts matt, die Konjunktiva geringfügig gerötet.

Auf Anruf reagiert der Kranke meist nicht. Aufforderungen kommt er noch nicht nach, nur wird die linke Hand dabei nicht bewegt. Auch spontan werden die linke Ober- und untere Extremität weniger bewegt als die rechten, sind aber nicht vollständig unbewegt.

Bei Beklopfen des Schädels werden keine Schmerzen angegeben, doch tritt dabei jedesmal rythmisches Zucken im linken Bein auf. Auch beobachtet man ähnliche spontane Zuckungen, die sich alle ½ Minute wiederholen. Sie äussern sich in einem kurzen Streckkrampf des ganzen Beines, dem dann rythmische Zuckungen in Fuss und grosser Zehe folgen. Dabei tritt auch eine Dorsalflexion der grossen Zehe auf.

Die Pupillen sind eng, reagieren beiderseits auf Lichteinfall.

Die Augen stehen gerade, gleichgerichtet, werden nach oben gleichmässig bewegt, dagegen kaum nach den anderen Richtungen. Das linke Augenlid kann auf Aufforderung unvollständig gehoben werden, das rechte nicht.

Der rechte Mundwinkel hängt etwas herab. Die rechte Gesichtsfalte ist nicht gestrichen, das rechte Auge ist nicht geschlossen. Die Zunge wird auf Befehl nur mit starkem Zittern hervorgestreckt. Das rechte Gaumensegel wird besser gehoben als das linke.

Herz o. B. Ausgesprochener Druckpuls ist nicht vorhanden.

Obere Extremität: Die Finger der linken Hand sind in Beugestellung spasmuskontrahiert. Der linke Arm wird spontan etwas im Ellbogen bewegt. Im Ellbogengelenk kein Spasmus.

Bauchdeckenreflex beiderseits positiv.

Untere Extremität: Deutlicher Spasmus im linken Kniegelenk. Der Patient befindet sich in Equinovarus-, die grosse Zehe in Babinskistellung. Der Knieschlenkreflex ist links etwas gesteigert, rechts positiv.

Der Augenhintergrund zeigt Stauungspapillen beiderseits.

Die Sensibilität lässt sich wegen des soporösen Zustandes des Patienten nicht rufen.

10. VI. 1925.

9 Uhr a. m. Patient ist vollkommen benommen, reagiert weder auf Anruf noch auf Nadelstiche. Die Atmung ist kurz, sakkadiert und röchelnd. Livide Flecken zeigen sich am ganzen Körper. Starker Schweissausbruch auf der linken Gesichtshälfte. Erbrechen. Der Puls ist relativ gut. Über dem Mittel- und Unterlappen der rechten Lunge besteht Schallverkürzung und scharfes Atemgeräusch.

9 Uhr 45 Min. a. m. erfolgt plötzlich der Exitus letalis.

Die im hiesigen pathologischen Institut unter Sektionsnummer 40/1925 1½ Stunde nach Eintritt des Todes vorgenommene Autopsie ergab folgenden Befund (Privatdozent Dr. Staemmler):

Schädelldach dünn, keine Rauhgigkeit der Tabula interna. Dura mater etwas über die Norm gespannt. Im Sinus longitudinalis reichlich flüssiges Blut. Innenseite der Dura glatt und spiegelnd. Arachnoidea der Konvexität besonders rechts auffallend trocken. Sulci verstrichen. Pia an der Basis im allgemeinen zart, in der Gegend der Sylvischen Furche etwas verdickt und fleckig weisslich getrübt. In der Pia am Fusse der rechten dritten Frontalwindung nahe der Sylvischen Grube findet sich ein Blutgefäss, das auf die Strecke von ungefähr 2 cm in einen derben, weissen soliden Strang umgewandelt ist. Auch hier ist die Pia der Umgebung weisslich verdickt. Die Stirnhirnrinde ist an der entsprechenden Stelle gerötet, von kleinen, nicht abgewischbaren Blutpunkten durchsetzt. Auch in der weiteren Umgebung finden sich noch einzelne kleine Blutungen innerhalb von Rinde und angrenzender Marksubstanz. Balken nicht vorgewölbt. Seitenventrikel nicht erweitert, enthalten etwas klaren Liquor. Ependym zart. Bei Eröffnung des 4. Ventrikels ist dieser erfüllt mit gewonnenem und flüssigem Blut. Dieses stammt aus einer mit fetzigen, blutig verfärbten Wänden umgebenen, zirka haselnussgrossen Höhle unterhalb des vorderen Teiles der Rautengrube, die breit in den 4. Ventrikel durchgebrochen ist. Die Höhle, deren Form unregelmässig, buchtig ist, hat ihren grössten Umfang in der rechten Hälfte der Brücke, etwa in deren mittlerem Teil. Sie erstreckt sich, wie Frontalschnitte durch die Vierhügelgegend zeigen, fast bis zum vorderen Ende der Brücke und ist mit ihren letzten Ausläufern, nach hinten sich verschmälernd, bis zum hinteren Rand der Brücke nachweisbar. Die Hirnmasse in ihrer Umgebung ist ödematös, zitronengelb gefärbt, vielfach von punktförmigen Blutungen durchsetzt. Die Gross- und Kleinhirnhemisphären zeigen im übrigen nichts Pathologisches. In den Stammganglien beiderseits und in der Gegend der Hirnschenkelhaube mehrere kleine, umschriebene Rötungen und punktförmige Blutungen.

An den Gehirngefässen wurde bei der Sektion keine wesentliche Veränderung festgestellt. Im besonderen erwiesen sich die grossen basalen Arterien bis auf die oben erwähnte Stelle als normal. Ganz besonders sei ferner betont, dass irgendwelche eulzig-fibrinösen Infiltrate an der Hirnbasis oder Knötchenbildungen in den weichen Hirnhäuten, etwa entlang den Gefässen, nicht nachzuweisen waren.

Sonst sei aus dem Sektionsprotokoll noch folgendes kurz hervorgehoben: Linke Lunge strangförmig mit der Pleura costalis verwachsen. Rechte Lunge frei. In der Spitze des rechten Oberlappens ein stecknadelkopfgrosser, subpleuraler Kalkherd. Kein Kalkherd in einer Drüse. Im oberen Teil des linken Unterlappens haselnussgrosser, scharf begrenzter, ca. 1 cm von der Pleura entfernt liegender Käseherd. Zugehörige Lymphdrüse an den Bronchien ebenfalls stark vergrössert und verkäst. Übrige Lunge gut lufthaltig, ohne Herderkrankung.

In der Schleimhaut der Ileocökalklappe mehrere konfluierende, unscharf begrenzte, flache tuberkulöse Geschwüre mit knötchenbesetztem Grunde. An anderen Organen nichts von tuberkulöser Erkrankung.

Nirgends Zeichen für Lues. Wassermannsche Reaktion (Leichenblut, in Hygien. Institut angestellt): negativ.

So ergab die Sektion bezüglich der Lokalisation eine gute Übereinstimmung der klinischen Diagnose mit dem pathologisch-anatomischen Befund. Es zeigte sich ein Prozess in der rechten Brückenhälfte, zu dem als Ursache des schnellen letalen Ausganges eine Blutung hinzugetreten war. Es handelt sich allerdings nicht um einen Tumor, wie vermutet, auch nicht um eineluetische Erkrankung, sondern, wie sich erst bei der mikroskopischen Untersuchung herausstellte, um eine Veränderung tuberkulöser Natur. Der Entwicklung und allmähliche Ausbreitung in den Meningen mit Übergreifen auf die Gehirnsubstanz der Brücke dokumentierte sich im Krankheitsbild unseres Patienten durch die unbestimmten zerebralmeningitischen Symptome: Kopfschmerzen, Übelkeit und Mattigkeit. Da die eigentlichen entzündlichen Veränderungen der Meningen wenig ausgeprägt waren, ist es verständlich, dass die meningitischen Symptome: Nackensteifigkeit, Kernig-Hyperästhesie vollständig in den Hintergrund traten. Klinisch entspricht dem Eintritt der Blutung die ganz akut einsetzende Lähmung der linken Körperhälfte. Und zwar handelt es sich hier um eine typische Hemiplegia alternans inferior (VII rechts, Extremitäten links), die den Prozess eindeutig an jene Stelle der rechten Brückenhälfte lokalisiert, wo sich die zentrale Bahn des Fazialis schon gekreuzt hat, während die übrige Pyramidenbahn noch ungekreuzt verläuft. Die Veränderungen am rechten Auge, die wohl im Sinne einer Keratitis neuroparalytica zu deuten sind, sprechen noch für eine Mitbeteiligung des rechten Trigeminus, die ja wohl bei dem weiten Vordringen der Blutung nach vorn bis zur Vierhügelgegend verständlich ist.

Zur Aufklärung der eigentlichen Natur des pathologischen Prozesses im Gehirn wurde der ganze Hirnstamm von der Vierhügelgegend bis zum verlängerten Mark in Formol gehärtet, in schmale Scheiben zerlegt, in Paraffin eingebettet und so stufenweise untersucht. Daneben wurden aus den Stammganglien und den verschiedensten Partien der Gross- und Kleinhirnhemisphären Stücke entnommen, besonders von solchen Stellen, die makroskopische Veränderungen gezeigt hatten. Aus jeder Hirnpartie wurden mehrere Schnitte mit Hämatoxylin-Eosin, ferner mit van Gieson-Lösung gefärbt. Zur Darstellung des Fibrins und der elastischen Fasern wurden die Weigert'schen Methoden benutzt, zum Nachweis von Blutpigment nach vorheriger Reduktion mit Schwefelammonium die Turnbulls-Blau-Reaktion. Dann wurde Tuberkelbazillenfärbungen hergestellt nach Ziehl-Neelsen und Kühne-Borrel. Spirochätenfärbungen nach Levaditi. Gefrierschnitte wurden auch mit Sudan III auf Fett untersucht.

Wie schon die makroskopische Untersuchung erwarten liess, sind im mikroskopischen Bild die weichen Hirnhäute im allgemeinen frei von stärkeren entzündlichen Veränderungen. Grössere Ansammlungen lympho- oder leukozytärer Zellen von grossen Exsudatzellen, Fibrinausscheidung in die Maschen der Leptomeninx und ähnliches, was bei typischer Meningitis tuberculosa stets besonders ins Auge fällt,

und fast völlig vermisst. Ebenso sucht man vergeblich nach eigentlichen Tuberkeln im Gewebe der weichen Hirnhäute.

Dagegen zeigt schon die schwache Vergrößerung eine ganz auffallende Veränderung an den Blutgefäßen. Vorzugsweise sind die Venen erkrankt, während die Arterien, selbst dort, wo sie stark erkrankten Venen unmittelbar anliegen, oft völlig normal geblieben sind. Eine solche Stelle zeigt Abb. 1. Auf ihr sehen wir schon bei der schwachen Übersichtsvergrößerung neben den intakten Arterien A1 und A2 Venen (V1 und V2), deren Wände hochgradige Veränderungen aufweisen. Sie sind auf ein Vielfaches der normalen Breite verdickt, die einzelnen Wandschichten kaum abzuheften, die ganze Wand in eine zellreiche, zum Teil von Riesenzellen durchsetzte, nekrotische Masse umgewandelt, die ein verengtes, oft exzentrisch gelegenes Lumen umschliesst.



Abb. 1.

Venenlängsschnitte zeigen, dass die oben angedeuteten Veränderungen nicht in Form umschriebener Knoten auftreten, sondern auf längere Strecken hin die Venenwand einnehmen.

Dort, wo die Gefäßveränderung voll ausgebildet ist, beobachtet man das in Abb. 2 wiedergegebene Bild: Die gesamte Venenwand ist in typisches tuberkulöses Granulationsgewebe umgewandelt. Vor allem ist von der Muskularis nichts mehr zu sehen. Nur das Endothel hat seine normale Beschaffenheit behalten. Stets ist innerhalb der Gefäßwand die für tuberkulöse Wucherungen charakteristische Anordnung der einzelnen Zellelemente zu sehen: ganz in der Peripherie, gewöhnlich im peri-

vaskulären Lymphraum liegend, finden wir den mehr oder weniger stark ausgebildeten Lymphozytenwall. Daran schliesst sich zum Lumen hin, bis an das Endothel vor- dringend, das lockere Gefüge der epitheloiden Zellen an, in das oft grosse, zahlreiche Kerne enthaltende Riesenzellen eingelagert sind. Beginnende Nekrose, die allerdings nur an wenigen Stellen nachweisbar ist, findet man bald in der Peripherie, in der Nähe des Lymphozytenwalls, bald aber auch mehr im Zentrum, in der Nähe des Endothels. Das fibrilläre Bindegewebe der Grundsubstanz ist in der Peripherie des Tuberkels meist recht gut erhalten. Zum Zentrum hin löst es sich aber mehr und mehr auf, bildet ein lockeres Netzwerk, das die epitheloiden Zellen umgreift. Bei der Auflösung der Fibrillen geht ihre Färbbarkeit für Giesons Lösung verloren, so dass man in der Nähe des Lumens nur mehr vereinzelte rotgefärbte Faserrestchen entdeckt. Elastikapräparate zeigen, dass die elastischen Elemente bis auf ganz geringe Reste in dem die Gefässwand durchsetzenden Gewebe zerstört sind.




Abb. 2.

Das tuberkulöse Gewebe ist vorwiegend konzentrisch um das Gefässlumen angeordnet. Seltener sieht man die Tuberkelbildung von einer umschriebenen Stelle der Wand ausgehen und sich hier vorwiegend entwickeln. Das Lumen liegt dann nicht mehr direkt im Mittelpunkt des Granulationsgewebes, sondern entsprechend exzentrisch.

Die epitheloiden Zellen zeigen alle Eigenschaften, die schon so oft in der Literatur angegeben worden sind, und auf die ich daher wohl nicht mehr einzugehen brauche. Häufig finden sich in ihnen Bilder, die auf amitotische Kernteilungen hindeuten und bald in bohnenförmig eingebuchteten Kernen, bald im Auftreten mehrerer Kerne in einer Zelle bestehen.

Riesenzellen sind in auffallend grosser Menge zur Ausbildung gelangt. Überall finden wir sie in das Gefüge der epitheloiden Zellen eingelagert, oft in so grosser Zahl und die einzelnen von so ungewöhnlicher Grösse, dass die Zellwucherung vorwiegend aus ihnen zusammengesetzt erscheint und die übrigen Elemente ganz in den Hintergrund treten.

und gedrängt werden. Ein solches Bild gibt Abb. 3 wieder: In der Peripherie sehen wir noch das lockere Gewebe der Bindegewebsfibrillen mit eingelagerten Lymphozyten. Hier und dort sind einige epitheloide Zellen eingestreut. Die direkte Umgebung des sehr stark verengten Gefäßlumens α aber wird eingenommen von den mächtigen Riesenzellen, die hier ausgesprochenen Langhansschen Typus aufweisen.




Abb. 3.

Die Form der Riesenzellen ist ausserordentlich mannigfaltig. Meistens lässt sich aber eine gewisse Anpassung an die Gestalt der röhrenförmig das Gefäß umgebenden tuberkulösen Wucherung insofern nachweisen, als der zum Lumen gekehrte Zellrand konkav, der entgegengesetzte aber konvex ist. Das Protoplasma ist vorwiegend im Zentrum gekörnt, weist Fortsätze auf, die direkt in das Tuberkelretikulum übergehen. Der protoplasmatische Randbezirk enthält oft Vakuolen von verschiedenster Grösse. Auch sind hier Zelleinschlüsse nicht selten. So findet man innerhalb der Riesenzellen häufig Lymphozyten, ab und zu auch Epitheloidzellen, deren Protoplasma sich noch deutlich gegen das umgebende Riesenzellprotoplasma abgrenzen lässt. Diese aufgenommenen Epitheloidzellen haben manchmal einen bohnenförmig gestalteten Kern. Einmal sah ich auch eine epitheloide Zelle mit zwei dicht nebeneinander gelegenen Kernen als Beweis einer eben erfolgten amitotischen Teilung. Kerne sind in ungeheurer Zahl in den Riesenzellen nachweisbar. Meistens überwiegt die von Langhans zuerst beschriebene Anordnung derselben: Länglich-ovale, gut abgrenzbare Kerne sind in dichter Reihe nebeneinander in der Randregion des Protoplasmas eingelagert oder, was nicht allzu selten ist, an den beiden Zellpolen angesammelt.

Bei der Entstehung der Riesenzellen scheinen Kernwucherungen in Epitheloidzellen ohne nachfolgende Protoplastenteilung die Hauptrolle zu spielen. Doch kommt daneben auch Verschmelzungen von Epitheloidzellen zu Riesenzellen vor. Wenigstens möchte ich so den Befund von deutlich abgegrenzten Epitheloidzellen im Leibe der Riesenzellen erklären.

Die tuberkulöse Granulationswucherung in der Venenwand hat scheinbar ihren äusseren Schichten, dem adventitiellen Bindegewebe, ihren Ausgang genommen. Hier beobachten wir, wenn sonst noch keinerlei Veränderungen zu sehen sind, nur selten Lymphozytenansammlungen, die den ersten Anfang des ganzen Prozesses anzustellen scheinen. Hier treten dann zuerst die Epitheloidzellwucherungen auf, die allmählich von aussen gegen das Lumen zu vorschieben. Hier sehen wir auch die ersten Riesenzellen sich entwickeln. Ja, selbst die Verkäsung ist oft zunächst in den peripheren Wandschichten am stärksten.

Das an die Venen angrenzende Gewebe ist durch die tuberkulöse Erkrankung nicht wesentlich in Mitleidenschaft gezogen. Nur in ihrer unmittelbaren Umgebung findet man in den Meningen leichte entzündliche Infiltrationen, in denen aber jegliche Zeichen degenerativer Prozesse (Verkäsungen usw.) fehlen. Auch produktive Bildungen spezifischer Art werden im Gewebe der weichen Hirnhäute ausserhalb der Gefässwände völlig vermisst, so dass man durchaus den Eindruck hat, dass die Lymphozyteninfiltrate in der Umgebung der Gefässe nur eine sekundäre Reaktion auf die primäre Gefässerkrankung darstellen. Der Gedanke, dass etwa eine primäre Meningitis tuberkulosa, wie es sonst oft beobachtet wird, zu einer sekundären Erkrankung der Venen geführt hat, hat in unserem Falle augenscheinlich keine Gültigkeit, sondern der Prozess ist den umgekehrten Weg gegangen. Eine Mitbeteiligung der Gehirnsubstanz selbst ist nirgends zu beobachten. Doch ist nicht selten zu sehen, dass die tuberkulöse Erkrankung der Venen sich mit diesen in die Gehirnsubstanz hinein fortsetzt. Gerade an diesen kleinen Venen ist der histologische Befund oft so eigenartig. Ist die ganze Venenwand in tuberkulöses Gewebe (besonders Epitheloidzellen) umgewandelt, so bietet ein Querschnitt durch das Gefässchen das Bild eines kreisrunden Tuberkels, der aber gegen jede Regel im Zentrum ein Blutgefäss (das Lumen der Vene, oft noch mit Blut gefüllt), enthält. Erst Längsschnitte zeigen, dass wir es nirgends mit umschriebenen Tuberkeln, sondern überall mit langen, mantelartigen Wandveränderungen tuberkulöser Natur zu tun haben.

So drängt sich uns bei diesem merkwürdigen Befunde (tuberkulöse Wucherung ausschliesslich innerhalb der Gefässwand, äusserst geringe Beteiligung der Meningen) der Gedanke auf, dass es sich hier nicht um eine tuberkulöse Meningitis im gewöhnlichen Sinne, sondern dass es sich vielmehr um eine ungewöhnliche primäre tuberkulöse Erkrankung der Gefässe innerhalb der Meningen handelt. Denn wenn auch bei der gewöhnlichen tuberkulösen Meningitis sich die Tuberkel ebenfalls in der Adventitia der Blutgefässe entwickeln, so ist das Charakteristische dort doch die Ausbildung umschriebener Knötchen, die aussen der Gefässwand ansitzen, während in unserem Falle, wie früher schon ausdrücklich betont, gerade typisch ist, dass die Venenwand selbst auf eine grössere Strecke hin in einen dicken Mantel aus Epitheloidzellen und Riesenzellen umgewandelt ist.

Gewiss machen auch bei der gewöhnlichen tuberkulösen Meningitis die Blutgefässe, sowohl Arterien wie Venen, mannigfache Umwandlungen durch

So finden wir in der Intima der Arterien Veränderungen, die wir grundsätzlich in zwei verschiedene Gruppen einordnen müssen, solche spezifisch tuberkulöser Natur und solche unspezifischer Natur, die erst sekundär auf Grund des in der Umgebung der Gefäße sich abspielenden meningitischen Prozesses auftreten. Diese letzteren entsprechen im wesentlichen nach Baumgarten² und Weintraud²¹ dem Bilde der Endarteriitis obliterans und sind von derluetischen Erkrankung der Hirnarterien Heubners schwer abzugrenzen. Charakterisiert ist diese Form durch das Auftreten eines unspezifischen Granulationsgewebes zwischen Endothel und Elastika interna. Typische Langhanssche Riesenzellen kommen nach Biber darin nicht vor, auch Guarnieri⁸ und Ranke¹⁴ haben solche nie gesehen, während Weintraud und Reuter von ihnen berichten. Bei starker und zirkulärer Ausdehnung dieser Intimawucherung kommt es wie in dem von Nonne beschriebenen Fall zu konzentrischer Einengung bis zur totalen Obliteration des Arterienlumens.

Neben dieser Endarteriitis obliterans sind in der Literatur auch vielfach spezifische Intimaalterationen beschrieben worden, die direkt durch die Anwesenheit des Tuberkelbazillus hervorgerufen werden.

So kommen umschriebene Knötchen vor, die nach Askanazy meistens von der Adventitia ihren Ausgang nehmen. Stets wird betont, dass es sich um wenig charakteristische Tuberkelformen handelt, die vornehmlich aus Lymphocyten bestehen. Typische epitheloide Zellen können gebildet werden. Riesenzellen vom Langhansschen Typ fehlen in den meisten Fällen. In den Arterien kleineren Kalibers gehen diese Knötchen allmählich in die mehr zirkuläre tuberkulöse Endarteriitis über, die zu schwerer Einengung des Gefäßlumens führen kann.

Die Adventitia der Arterien ist bei der tuberkulösen Meningitis stets beteiligt, gewöhnlich in Form einer kleinzelligen Infiltration, die oft so stark ist, dass sie den ganzen perivasalen Lymphraum anfüllt. Guarnieri, Brodowski¹⁴, Hirschberg, Gehry⁷, Weintraud, Cornil⁵, Biber fanden nur Verkäsung neigende miliare Tuberkel, die von hier aus auf die übrigen Wandschichten übergreifen konnten.

In der Media werden weniger Veränderungen entzündlicher als vielmehr in degenerativer Natur angegeben, die wohl erst als Folge der Erkrankung der anderen Arterien-schicht auftreten. Die Muskulatur wird allmählich atrophisch und bildet nur mehr eine fast homogene, leicht gekörnte, schlecht färbbare Masse. Als Folge dieser hyalinen oder fibrinoiden Degeneration (Askanazy) der Media kann aneurysmatische Ausbuchtung der Arterien auftreten.

Sind sämtliche Arterienwandschichten gleichzeitig entzündlich infiltriert, so haben wir das Bild der Panarteriitis tuberkulosa vor uns.

Von Venenveränderungen wird in der Literatur der Meningitis tuberkulosa nur kurz berichtet. Im allgemeinen herrscht das Bild der Panphlebitis vor mit diffuser Infiltration sämtlicher Wandschichten. Nach Biber kann es höchst selten zur Eruption von Tuberkeln kommen. Askanazy dagegen hat sie häufiger beobachtet. Umschriebene Knötchen ragen dann ins Lumen vor und engen es ihrer Grösse entsprechend mehr oder weniger ein. Andererseits spricht er von einer mehr flächenhaft ausgebreiteten tuberkulösen Endophlebitis, die der tuberkulösen Endarteriitis entspricht.

Unser Fall ist dadurch interessant, dass die Erkrankung der Gefässe einen von dem Üblichen abweichenden Charakter zeigt. Die Unterschiede bestehen darin, dass 1. die Venen gegenüber den Arterien sehr stark bevorzugt sind, 2. die Veränderung stets sämtliche Wandschichten betrifft und 3. dass die Veränderung überall das vollentwickelte Bild einer sehr typischen tuberkulösen Granulationswucherung zeigt, die aber nicht in Form einzelner Knötchen, sondern in Form einer diffusen Wandveränderung auftritt.




Abb. 4.

Dagegen ist von den in der Literatur beschriebenen Arterienveränderungen verhältnismässig wenig zu sehen. Am häufigsten findet sich noch eine isolierte Rundzelleninfiltration der Adventitia. Höchst selten habe ich eine Arterie mit hyalin veränderter Media gesehen. Zirkuläre Tuberkelbildung innerhalb der Arterienwand findet sich nur an wenigen Stellen, von denen ich die typischste in Abb. 4 wiedergebe. Subendotheliale Granulationswucherung war nirgends nachzuweisen.

Die Tuberkelbazillenfärbung fiel in meinen Präparaten negativ aus. Trotzdem handelt es sich zweifellos um einen spezifisch tuberkulösen Prozess.

für spricht zunächst das Vorhandensein florider tuberkulöser Herde in anderen Organen (Lunge, Darm) des Patienten; vor allem aber bietet das Granulationsgewebe in der Venenwand, sowohl was die Art seiner zelligen Elemente als auch deren Anordnung zueinander betrifft, ein für Tuberkulose charakteristisches Bild, dass in dieser Beziehung kein Zweifel aufkommen kann. Die fast völlige Zerstörung der elastischen Fasern in dem neugebildeten Granulationsgewebe und die mangelnde Neigung desselben zu fibröser Umwandlung können noch gegen eine etwa in Frage kommende Lues angeführt werden, für die aber auch sonst weder in der Anamnese, noch in dem Organ-, noch in dem Blutbefund irgend ein Anhaltspunkt zu entdecken wäre. Zudem lassen sich Spirochäten in meinen Präparaten nicht nachweisen.




Abb. 5.

Die Infektion der Meningen erfolgte wahrscheinlich von dem verkästen Augenerd aus. Da gleichzeitig auch noch andere Organe tuberkulös erkrankten, müssen wir eine hämatogene Aussaat annehmen. Auch die starke Beteiligung des Plexus chorioideus spricht nach Kment²² für eine hämatogene Entstehung der tuberkulösen Erkrankung der Meningen. Wahrscheinlich ist in unserem Fall der Plexus zuerst erkrankt. Von ihm aus erfolgte dann die Infektion der Arachnoidalflüssigkeit und weiterhin der perivaskulären Räume, von wo aus dann die Erkrankung der Adventitia und schliesslich der ganzen Gefässwand ihren Ausgang nahm. Schwierig ist zu erklären, weshalb es zu einer fast ausschliesslichen Erkrankung der Venen kam. Vielleicht liegt der Grund darin, dass der lockere Bau der Venenwand der Granulationsgewebsbildung einen geringeren Widerstand entgegengesetzt als die dicke Arterienwand, deren dicke Muskularis vor allem wenig zu tuberkulöser Umwandlung neigt.

Die geschilderte Gefässerkrankung konnte nicht ohne schwerwiegende Folgen in anatomischer wie auch in funktioneller Hinsicht bleiben. Die starke Zellwucherung innerhalb der Venenwand muss zu einer Raumbeengung führen, die sich in einer bis zur totalen Obliteration fortschreitenden Engung des Lumens bemerkbar macht. War schon in Abb. 2 eine solche geringem Grade nachweisbar, so stellen Abb. 3 und 5 weiter vorgeschrittene Stadien dar. In beiden ist die Gefässlichtung schon auf das Stärkste eingeengt. Zuweilen konnte sogar ein vollständiger Verschluss des Lumens nachgewiesen werden.

Andererseits kann es bei Schädigung des Endothels, z. B. bei bis zur Intima vordringender Verkäsung dieser tuberkulösen Massen, zur Bildung von Thromben in den erkrankten Venen kommen. So finden wir in der Kleinhirn-Brückengegend in kleineren, in die Tiefe der Gehirnfurchen sich einsenkenden Venen thrombotische Massen, die das Lumen vollständig verschliessen. Es handelt sich meistens um reine Abscheidungs- in kleineren Venen auch um hyaline Thromben. Sehr weitgehende Thrombose zeigt sich in den Pialvenen verschiedener Grosshirnbezirke.

Die beschriebene tuberkulöse Erkrankung der Venen ist nun nicht im ganzen Gehirn gleichmässig verbreitet. Die stärksten Veränderungen finden sich in den Partien, die schon makroskopisch durch Blutungen erkrankt zu erkennen waren. In geringerem Grade aber sind die Venen auch in solchen Teilen von Hirnrinde und Stamm befallen, die makroskopisch normal erschienen. Die grösste Ausdehnung hat der Prozess an den Venen der Brücke erreicht, wo er sich, wie meist, auch mit den Gefässen in die Gehirns substanz hinein fortsetzt. Dagegen sind die Arterien bis auf wenige Ausnahmen frei. Deshalb muss es bei der ausgedehnten Verbreitung des Prozesses zu ausgesprochenen Zirkulationsstörungen innerhalb der Gehirns substanz kommen, die auf einer Behinderung des venösen Abflusses beruhen. Dies ist in der Tat deutlich nachweisbar und besonders an Venenlängsschnitten gut zu beobachten: man sieht häufig in der Gehirns substanz in der Nähe der Meningen eine Vene umschieden und eingeengt von dem bekannten tuberkulösen Gewebe. Dort, wo dieser Prozess aufhört, lässt sich dann in dem weiter peripherwärts gelegenen Gefässabschnitt eine ausgesprochene Erweiterung des Gefässlumens als Ausdruck der Stauung erkennen. In manchen Stellen kommt es direkt zu varixartigen Bildungen. Innerhalb des Venenlumens sieht man häufig wandständige Leukozyten die im Zentrum gelegenen Erythrozyten einrahmen. Wir haben also das typische Bild einer venösen Stase vor uns. All diese hochgradig gestauten Venen liegen also schon in dem Bereich der grossen Hämorrhagie in der Brücke, auf die wir jetzt näher eingehen will.

Das makroskopische Verhalten der Blutung ist schon im Sektionsprotokoll angegeben. Bei der mikroskopischen Untersuchung des noch

nen Teils des blutigen Erweichungsherdes fällt zunächst auf, dass er eine einzige kompakte Hämorrhagie darstellt, sondern er setzt sich aus zahlreichen, grösseren und kleineren Einzelblutungen, die durch schmale, streifenförmige Inseln von Hirngewebe von einander getrennt sind. An den Durchbruchsstellen in den IV. Ventrikel finden sich einzelne ausgedehnte, mehr diffuse Herde, die aber bei genauerer Betrachtung den Eindruck machen, dass auch sie aus einzelnen Blutungen entstanden sind, die das zwischenliegende Gewebe völlig infiltrierten. Zur Basis der Brücke hin werden die Einzelblutungen allmählich immer kleiner, nehmen die Form typischer Ring- und Kugelblutungen an und verschwinden schliesslich ganz. An vielen Stellen dringt die Blutung aber auch in Gestalt breiter Blutstreifen weit in das umgebende Gewebe hinein.

Die grösseren Herde zeigen ein ganz gleichmässiges Aussehen. Erythrozyt neben Erythrozyt in das hin und wieder noch sichtbare Glianetzwerk eingelagert. Daneben finden sich nur wenige Kerne, die deutliche Lappung aufweisen und wohl den Leukozyten des Blutes angehören. Nur selten trifft man noch eine Insel von Hirngewebe, das aber stets nur mehr eine homogene, aus wenigen Gliakernen ausgestattete Masse darstellt. Markfasern sind in diesem Bereich der Blutung nicht mehr erkenntlich.

Im Zentrum all dieser blutigen Infiltrate liegen nun die schon erwähnten, oft mit Blut gefüllten Venen und varixartigen Bildungen. Häufig trifft man auch statt der Gefässe Stellen, die nahezu homogen aussehen, wenige Kerne und keine Erythrozyten enthalten, sich mit Eosin diffus färben und die wir wohl als abgestorbene und hochgradig gequollene Gefässwand betrachten müssen.

Denn ausser der starken Ausweitung ihres Lumens fallen an den Gefässen innerhalb der Blutungsherde weitgehende degenerative Prozesse auf. Meist durchweg ist die Wandung in ihrem Bau undeutlich geworden und gegen die Umgebung schwer abgrenzbar. Der Prozess schreitet an manchen Stellen bis zur völligen Homogenisierung fort. Vielfach zeigt die Wand auch körnige Beschaffenheit, und dann ist sie meistens reichlich mit Leukozyten infiltriert. An Schnittpreparaten mit Fibrinfärbung sieht man manchmal die Durchsetzung der Wand mit Faserstoff, der merkwürdigerweise aber nicht in der umgebenden Blutung nachweisbar ist. Die Elastinfärbung macht nur an ganz wenigen Stellen einen Rest elastischer Fasern sichtbar. Eine Verfettung der Gefässwand ist nicht nachzuweisen.

Die in der Peripherie der Hämorrhagie gelegenen Ring- und Kugelblutungen bieten die aus der Literatur (M. B. Schmidt¹⁹, Biber, Dietrich⁶) wohl allgemein bekannten Bilder, die ich nicht noch einmal beschreiben möchte. Merkwürdig ist, dass in ihrem Bereich das zwischen den Erythrozyten noch sichtbare Hirnparenchym gut erhalten ist. Vor allem sind die sonst doch sehr labilen Ganglienzellen wenig verändert. Nirgends finden sich hier

aber auch Zeichen von irgendwelcher Reaktion des gesunden Gewebes auf die Schädigung. Vor allem vermissen wir jede stärkere Gliazellwucherung und das Auftreten von Körnchenzellen. Nirgends ist Neuronophagie zu sehen.

Präparate aus den Teilen des Grosshirns, die die makroskopisch evidenten Blutungen aufwiesen, deckten nur herdförmig gruppierte, kleine Ringblutungen auf. Die venöse Stase war bei weitem nicht so ausgesprochen wie in der Hauptblutung, obschon gerade hier reichlichste Thrombose nachweisbar war. Die spezifisch tuberkulösen Gefässveränderungen traten dagegen viel mehr in den Hintergrund.

Fragen wir uns nun, auf welche Art der Blutaustritt aus den Gefässen erfolgte, so müssen wir auf Grund des reichlichen Befundes von Ring- und Kugelblutungen als Hauptsache Diapedese annehmen, wird doch heute allgemein der Zustandekommen dieser Blutungsformen allgemein auf diese Weise erklärt. Das mikroskopische Bild bietet ja auch überall Gelegenheit, alle Stadien dieses Vorganges zu beobachten. Hinzu kommen dann vorwiegend im Zentrum im Bereich der hochgradig gestauten Venen, Rhaxisblutungen, deren Ausgangspunkt von einer klaffenden Rissstelle in der Gefässwand häufig geringfügig nachweisbar ist. Die Blutung scheint dabei nicht mit allzu grosser Gewalt erfolgt zu sein, denn dann müsste sie rücksichtslos alles in ihrem Weg liegende Gewebe zertrümmert haben. Davon ist aber nirgends etwas zu sehen. Man hat vielmehr den Eindruck, dass die das Gefäss verlassenden roten Blutkörperchen dort ausgebreitet werden, wo sie im Gewebe den geringsten Widerstand finden, so dass häufig noch Teile des Gliamaschenwerkes innerhalb der Blutung erhalten bleiben. Zudem lässt die Kernarmut des blutig infiltrierten Hirngewebes daran denken, dass hier schon vor der Blutung degenerative Prozesse vor sich gegangen sind, die zum Untergang spezifischer Elemente geführt hatten.

Wir müssen daher nach einem schädigenden Moment suchen, das schon vor dem Zustandekommen der Hämorrhagie sowohl auf das Hirnparenchym als auch die Gefässe einwirkte und zu den geschilderten degenerativen Veränderungen führte. Als solches müssen wir die durch die tuberkulöse Venerkrankung bedingte venöse Stase ansehen, die wahrscheinlich schon längere Zeit vor Eintritt der Blutung bestand. Sie mag zu Ernährungsstörung der Gefässwand entweder durch die Verlangsamung des Blutstromes allein oder zugleich durch die Kompression der Vasa vasorum geführt haben. Vielleicht hat aber auch die daraufhin einsetzende Transsudation bei längerer Dauer Anlass zu der Gefässdegeneration gegeben und eine so starke ödematöse Durchtränkung des Hirngewebes bedingt, dass es zu einer Quellung der Gliazellfasern und allmählichem Schwund der Markfasern kam. Diese verflüssigten sich und wurden dadurch dem morphologischen Nachweis entzogen. Merkwürdig und schwer erklärlich ist nur das völlige Fehlen von Körnchenkugeln in der Nähe dieser Hirnbezirke. Unser Befund erinnert in dieser Beziehung sehr

Ergebnisse Rosenblaths¹⁷, der Hirnblutungen bei Schlaganfall systematisch untersuchte. Dort finden wir die gleichen Verhältnisse, indem die Blutung aus schwer degenerierten Gefässen in ein schon vorher verändertes Gewebegebiet hinein erfolgt. Auch Rosenblath vermisste in diesen Herden häufig die Abräumzellen, die doch sonst sehr bald im Bereich zerfallender Gewebesubstanz auftreten.

Es ist klar, dass bei den hochgradig degenerierten Gefässen schon ein geringer Anstoss genügt, um die Gefässruptur herbeizuführen. Ist aber eine solche Ursache einmal vorhanden, so besteht natürlich die Gefahr, dass die Ruptur sich nicht auf ein einziges Gefäss beschränkt, sondern, da die Degeneration in allen betroffenen Gefässen nahezu gleich weit fortgeschritten ist, nach einem Schläge die Eröffnung zahlreicher solcher mächtig gestauten Venen erfolgt. Dass es sich in unserem Fall so verhält, lässt sich schon daraus ablesen, dass die Blutung überall gleichen Alters und zwar ganz frischen Charakters ist. Denn bei etappenförmig nacheinander erfolgten Blutungen müsste man in den älteren Bezirken Körnchenkugeln und Blutpigment sehen. Trotz aller unsere Bemühungen, sie nachzuweisen, blieben erfolglos. Der bald eintretende Tod des Patienten hatte die Entwicklung reaktiver Prozesse verhindert.

Welcher Umstand ist nun aber in diesem Falle als auslösendes Moment für die an den verschiedensten Stellen gleichzeitig erfolgenden Extravasationen anzusehen? Diese Frage ist schwer zu beantworten, kann doch bei so hochgradiger Gefässschädigung schon eine Blutdrucksteigerung geringen Grades ausreichen. Ob nun auch in unserem Falle eine solche verantwortlich zu machen ist oder ob die Entstehung von Thromben in einer Anzahl kleinerer Venen in der Kleinhirn-Brückegegend, die sicher ganz junger Natur sind, das Gefäss zum Überlaufen gebracht hat, wird sich nicht mehr mit Sicherheit nachweisen lassen. Oeller¹³ schreibt gerade Thrombosen solcher intergyraler Venen wegen ihrer ungenügenden Anastomosen grössere Bedeutung zu. Natürlich soll sie nicht allein verantwortlich zu machen, sondern die gesamte Zirkulation war durch die tuberkulöse Wandveränderung der Venen so weitgehend gestört, dass es nur des auslösenden Momentes bedurfte, um an zahlreichen Stellen gleichzeitig die Blutung eintreten zu lassen, die dort am stärksten war, wo durch Erkrankung sehr zahlreicher Venen der Abfluss des Blutes am meisten erschwert war.

Zusammenfassung.

Fassen wir nun das Ergebnis der makro- und mikroskopischen Untersuchung unseres Falles zusammen, so handelt es sich um eine schwere Hirnblutung bei tuberkulöser Erkrankung der weichen Hirnhäute. Diese hatte nicht zum eigentlichen Bild der Meningitis tuberculosa geführt, sondern eine eigenartige Veränderung in den pialen Gefässen und zwar fast ausschliesslich der Venen hervorgerufen, deren ganze Wand auf weite Strecken in typisches

tuberkulöses Granulationsgewebe (typische Epitheloidzellen und Riesenzellen) umgewandelt war. Die Wucherung des neugebildeten Gewebes führte zu zunehmender Einengung bis vollständiger Obliteration des Gefäßlumens, eine bis zum Lumen fortschreitende Verkäsung zu Thrombenbildung innerhalb der geschädigten Venen. Die Folge des Gefäßverschlusses war eine hochgradige venöse Stase innerhalb der kleinsten Venen, die durch den Druck des gestauten Blutes eine beträchtliche Ausdehnung ihrer Wand erfuhr. Dort, wo die Stauung am hochgradigsten war, kam es zu ausgesprochen varixartigen Bildungen. Diese Zirkulationsstörung führte nun infolge Ernährungsstörungen, die die gedehnte Gefäßwand betrafen, zur weitgehenden degenerativen Veränderung derselben. Auch das umliegende Hirngewebe wurde durch die mangelnde Ernährung und das auftretende Ödem geschwunden gebracht. Die unmittelbare Ursache zur Blutung gab wahrscheinlich eine plötzlich auftretende Thrombose innerhalb kleiner zugehöriger intergyraler Venen, wodurch die Zirkulationsstörung ihren Höhepunkt erreichte. Der Blutaustritt erfolgte in der Hauptsache auf dem Wege der Diapedese, die zur Ausbildung der typischen Kugel- und Ringblutungen führte. Andererseits kamen in den am stärksten gestauten zentralen Gebieten, an der Wand des IV. Ventrikels anliegend, noch Rhexisblutungen hinzu, indem die weitgehend geschädigten Venen dem auf ihnen lastenden und ganz plötzlich durch die Thrombose verstärkten Druck nachgaben und zerrissen. Die Ventrikelwand wurde dabei in die blutige Erweichung einbezogen, zerfiel und die tödliche Blutung in den IV. Ventrikel hinein konnte erfolgen.

Das seltene Vorkommen grösserer Hämorrhagien bei tuberkulöser Erkrankung der weichen Hirnhäute, die eigenartigen und ausgedehnten Gefäßveränderungen, nicht zuletzt der interessante Zusammenhang zwischen ihnen und der Blutungsgenese, rechtfertigen wohl die ausführliche Mitteilung des Falles.

Literaturangabe.

1. *Askanazy*, Die Gefäßveränderungen bei der akuten tuberkulösen Meningitis. Arch. f. klin. M. 99. 1910. — 2. *Baumgarten*, Gummöse Arteriitis und entsprechende tuberkulöse Veränderungen. Virch. Arch. 86. — 3. *Biber*, Über Hämorrhagien und Gefäßveränderungen bei tuberkulöser Meningitis. Frankf. Zschr. f. Path. 6. 1911. — 4. *Brodsky*, zitiert bei Biber (3). — 5. *Cornil*, zitiert bei Biber (3). — 6. *Dietrich*, Die Entstehung von Ringblutungen des Gehirns. Zschr. f. d. ges. Neurol. Orig. 68. 69. 1921. — 7. *Gey*, Zur Histopathologie der tuberkulösen Meningitis. Arch. f. Psych. 45. H. 1. — 8. *Guarnieri*, zitiert bei Biber (3). — 9. *Hirschberg*, Über eine abnorme Form der Meningitis tuberculosa. D. Arch. f. klin. M. 41. — 10. *Huguenin*, Akute und chronische Entzündungen des Gehirns und seiner Häute. Ziemssens Hb. 11. 1878. — 11. *Kaufmann*, Spezielle pathologische Anatomie. (7 u. 8). 1922. — 12. *Nonne*, Zur Pathologie der nichteitrigen Enzephalitis. D. Zschr. f. Nervhkl. 18. 1900. — 13. *Oeller*, Pathologisch-anatomische Studien zur Frage der Entstehung und Heilung von Hirnblutungen usw. D. Zschr. f. Nervhkl. 47.

8. — 14. *Ranke*, Beiträge zur Lehre der Meningitis tuberculosa. Histologische und path. Arbeiten über die Grosshirnrinde, herausgegeben von Nissl. 2. 1908. — 15. *Rein-*
Klinische Beiträge zur Kenntnis der akuten Miliartuberkulose. D. Arch. f. klin. M.
— 16. *Reuter*, Blutung im linken Stirnlappen des Gehirnes bei tuberkulöser Meningitis
Jb. f. Psych. 39. 1919. — 17. *Rosenblath*, Über die Entstehung der Hirnblutung bei
Schlaganfall. D. Zschr. f. Nervhik. 61. 1918. — 18. *Seitz*, Die Meningitis tuberculosa
Erwachsenen. Berlin 1874. — 19. *Schmidt, M. B.*, Über Gehirnpurpura und hämor-
gische Enzephalitis. Zieglers Beitr. 7. Suppl., Festschr. f. Arnold. — 20. *Vanzetti*,
ert bei Askanazy (1) und Biber (3). — 21. *Weintraud*, Über die Pathogenese der Herd-
ptome bei tuberkulöser Meningitis. Zschr. f. klin. M. 26. — 22. *Kment*, Zur Meningitis
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Genese. Leipzig 1924.
-

